

CEASE Therapie

Dr. Tinus Smits

Checkliste Gesundheit und Medikamente

Name:

Geburtsdatum:

1. Vor der Schwangerschaft: Vater und Mutter

- ① Impfungen gegen Tropenkrankheiten: DTP, Typhus, Gelbfieber, Hepatitis A, Hepatitis B, Cholera, Tollwut
- ① Malaria-Prävention (Malarone, Lariam)
- ① Krankheiten z.B.: Drüsenfieber (Pfeiffer), Lyme-Borreliose, Colitis oder Crohn, Asthma, Epilepsie, Migräne, Depression und deren Behandlung oder Medikamente
- ① Operationen, Anästhesie
- ① Amalgamfüllungen
- ① Tetanustoxoidimpfung bei Verletzung
- ① Hepatitis B Impfung: für Ärzte, Krankenschwestern, medizinisches Personal, oder als Tropen-Impfung
- ① IVF, IUI: Clomid (Clomiphencitrat), Pregnyl (Choriongonadotropin)
- ① Anwendung von Hydrocortisoncreme (Hydrocortison)
- ① Geschlechtskrankheiten; Herpes (labialis oder genitalis)
- ① Gebrauch von Drogen: Cannabis, Kokain, Ecstasy

2. Während der Schwangerschaft.

- ① IUI, IVF: Clomid, Pregnyl
- ① Zahnbehandlungen mit lokaler Anästhesie und/oder Amalgamfüllungen
- ① Röntgenbilder für Zahnarzt oder Krankenhaus/Klinik
- ① Mantoux (Test auf Tuberkulose)

- ① Impfungen, Tetanus oder Tropenimpfungen
- ① Dauermedikation bei Asthma, Colitis, Epilepsie oder anderen Krankheiten
- ① Anwendung von Hydrocortisoncreme (Hydrocortison)
- ① Antihistaminika gegen Heuschnupfen
- ① Medikamente gegen Übelkeit und Erbrechen
- ① Antacida: Maalox, Antagel und Gaviscon (Aluminumoxid)
- ① Rennies (mit 10 mg Aspartam pro Tablette)
- ① Antibiotika
- ① Eisentabletten während der Schwangerschaft (Ferrograd)
- ① Medikamente gegen hohen Blutdruck (Nifedipin)
- ① Paracetamol 500 (enthält 40 mg Aspartam)
- ① Nasenpray: Xylomethazolin, Fluticason
- ① Vaginaltabletten oder -creme gegen Hefeinfektion (Pilzinfektion) Canesten, Clotrimazol
- ① Medikamente gegen Herpes (labialis oder genitalis)
- ① Medikamente gegen Geschlechtskrankheiten
- ① Schlafmedikamente
- ① Injektion in der 28.-30. Woche von AntiRhesus (D)-Globulin
- ① Steroidinjektionen für die Lungenreifung (Betamethason or Dexamethason)
- ① Medikamente zum Wehenhemmen (Ritodrinhydrochlorin, Nifedipin, Partusisten)
- ① Emotionale Ereignisse mit Einnahme von Beruhigungsmitteln oder Tranquillizern
- ① Künstliche Süßungsmittel: Süßstoff-Tabletten mit Aspartam; Kaugummi mit Aspartam; Light-drinks (Cola-light) mit Aspartam
- ① Regelmäßige Einnahme von Lakritz
- ① Einname von Alkoholischen Getränken
- ① Gebrauch von Drogen: Cannabis, Kokain, Ecstasy
- ① Rauchen
- ① Deodorant (enthält fast immer Aluminum)
- ① Kochen in Aluminumpfannen

3. Während der Geburt.

- ① Medikamente zur Wehenauslösung (Oxytocin)
- ① Schmerzmedikamente
- ① Anästhesie
- ① Beruhigungsmittel
- ① Schlafmedikamente

4. Die ersten zwei Lebensjahre des Kindes (und der Mutter während des Stillens)

- ① Impfungen: BCG, Hepatitis B, Hepatitis A, DTPP-HIB-Pneumokokken, MMR, Meningokokken-C, DTP, Tropenimpfungen, Grippeimpfung.
- ① Schmerzmedikamente oder Fiebermedikamente (Paracetamol)
- ① Nasenspray (Xylomethazolin)
- ① Medikamente gegen Husten (Antitussiva, um den Husten zu unterdrücken)
- ① Antibiotika
- ① Inhalationen gegen COPD, Asthma (Salbutamol, Ventolin)
- ① Medikamente für die Mutter während des Stillens (Mastitis, Brustinfektion)
- ① Medikamente gegen Soor (Nystatin)
- ① Medikamente gegen Reflux oder Erbrechen
- ① Antacida mit Aluminium (Gaviscon, Maalox, Antagel)
- ① Medikamente gegen Durchfall (Loperamid)
- ① Medikamente gegen Würmer
- ① Anästhesie (wegen Paukenröhrchen, Mandelentfernung u.a.)
- ① Medizinisch diagnostische Tests mit Kontrastmitteln
- ① Aufwärmen der (Plastik) Babyflasche und Babynahrung in der Mikrowelle
- ① Plastikfolie zum Abdecken von Nahrungsmitteln
- ① Vinyl-Bodenbelag im Schlafzimmer oder in anderen Räumen im Haus